

| <b>Cod.</b> | <b>AOU – Policlinico di Modena – Casistica anno 2016<br/>Indicatori di performance clinica e/o organizzativa<br/>Elaborazione interna aziendale a partire dal profilo indicatori<br/>relativo al programma regionale SIVER</b> |    | <b>Ob.</b> | <b>RIS</b>    | <b>AI</b>      |
|-------------|--|----|------------|---------------|----------------|
| 9183        | bersaglio C6.4.3 - Embolia polmonare o trombosi venosa post-chirurgica   | <= | 0,3%       | <b>0,1%</b>   | <b>12/2016</b> |
| 9112        | bersaglio C6.4.1 - Sepsis post-operatoria in chirurgia d'elezione  | <= | 0,4%       | <b>0,4%</b>   | <b>12/2016</b> |
| 9012        | bersaglio C16.1 * - % pazienti con codice giallo visitati entro 30 min   | >= | 68,8%      | <b>82,5%</b>  | <b>09/2016</b> |
| 9009        | bersaglio C16.2 * - % pazienti con codice VERDE visitati entro 1 h   | >= | 64,5%      | <b>64,3%</b>  | <b>12/2016</b> |
| 8698        | PNE n.68 - Frattura di tibia/perone: % pazienti con tempo d'attesa per intervento chirurgico (l'esito in studio è l'intervento entro 30 giorni)  | >= | 100,0%     | <b>100,0%</b> | <b>12/2016</b> |
| 8338        | PNE n.21 - BPCO riacutizzata: mortalità a 30gg   | <= | 9,9%       | <b>7,9%</b>   | <b>12/2016</b> |
| 8335        | PNE n.317 - Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)   | <= | 0,8%       | <b>1,3%</b>   | <b>12/2016</b> |
| 8334        | PNE n.203 - Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)   | <= | 0,5%       | <b>0,8%</b>   | <b>12/2016</b> |
| 6778        | PNE n.83 - Intervento chirurgico per TM del colon: mortalità a 30 giorni dall'intervento   | <= | 4,1%       | <b>2,9%</b>   | <b>12/2016</b> |
| 6777        | PNE n.82 - Intervento chirurgico per TM dello stomaco: mortalità a 30 giorni dall'intervento   | <= | 6,1%       | <b>5,3%</b>   | <b>12/2016</b> |
| 6687        | PNE n.63 *- Intervento per TM Polmone: mortalità a 30 giorni   | <= | 1,3%       | <b>0,0%</b>   | <b>12/2016</b> |
| 6675        | PNE n.302 - Colectomia laparoscopica in RO: proporzione con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni   | >= | 69,2%      | <b>92,6%</b>  | <b>12/2016</b> |
| 6669        | PNE n.18 - Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni dal ricovero   | <= | 12,1%      | <b>9,4%</b>   | <b>12/2016</b> |
| 6667        | PNE n.15 - Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero  | <= | 11,1%      | <b>3,8%</b>   | <b>12/2016</b> |
| 6664        | PNE n. 6 - INFARTO MIOCARDICO ACUTO: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni   | >= | 43,3%      | <b>52,4%</b>  | <b>12/2016</b> |
| 6660        | PNE n. 1 - INFARTO MIOCARDICO ACUTO: mortalità a 30 giorni   | <= | 9,0%       | <b>11,8%</b>  | <b>11/2016</b> |
| 6626        | PNE n.42 - Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni   | >= | 70,0%      | <b>72,3%</b>  | <b>12/2016</b> |
| 10858       | PNE n.601 - Interv. chirurgico per T cerebrale   | <= | 2,7%       | <b>0,0%</b>   | <b>11/2015</b> |
| 10796       | PNE n.37 - Proporzioni di parti con taglio cesareo primario (RER) elab TORCASIO  | <= | 25,0%      | <b>25,2%</b>  | <b>12/2016</b> |
| 10786       | PNE n.605 - Proporzioni di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella   | <= | 9,9%       | <b>10,9%</b>  | <b>12/2016</b> |
| 10408       | % ADESIONE ALL'INDAGINE CLIMA INTERNO  | >= |            | <b>28,6%</b>  | <b>12/2016</b> |
| 10156       | Bersaglio C4.4 - Colectomie laparoscopiche in Ds e in RO 0-1 G   | >= | 35,8%      |               | <b>12/2016</b> |