

Prova Scritta N.2

1. E' un segno tipico delle sindromi cerebellari il:
 - a. Tremore a riposo
 - b. Tremore di azione**
 - c. Tremore di attitudine
 - d. Tremore di posizione

2. Qual è l'azione principale del muscolo gracile in relazione all'articolazione coxofemorale?
 - a. Abduzione
 - b. Adduzione**
 - c. Flessione
 - d. Estensione

3. Quale fra i seguenti muscoli è un estensore del gomito?
 - a. Anconeo**
 - b. Popliteo
 - c. Lungo supinatore
 - d. Coraco-brachiale

4. Quale fra le seguenti articolazioni possiede due assi di rotazione?
 - a. La spalla
 - b. L'anca
 - c. Il ginocchio**
 - d. L'interfalangea distale

5. La clavicola si articola con la scapola:
 - a. Esclusivamente tramite la spina della scapola
 - b. Esclusivamente tramite l'acromion**
 - c. Esclusivamente tramite la coracoide
 - d. Tramite l'acromion e la coracoide

6. Quando nel corpo umano si sviluppano forze concordi, si è in presenza dell'azione simultanea di muscoli:
 - a. Antagonisti
 - b. Stabilizzatori
 - c. Coagonisti**
 - d. Neutralizzatori

7. In un passo, la fase d'appoggio impegna percentualmente circa:
 - a. Il 20% del ciclo
 - b. Il 35% del ciclo
 - c. Il 50% del ciclo
 - d. Il 60% del ciclo**

8. I centri respiratori si trovano:
 - a. Nel mesencefalo
 - b. Nel bulbo**
 - c. Nel talamo
 - d. Nell'ipotalamo

9. Quale tra i seguenti aspetti neurologici non è tipico della sindrome frontale bilaterale?
- Disturbi comportamentali
 - Rigidità del pensiero
 - Afasia di espressione**
 - Difficoltà di pianificazione e di esecuzione di attività anche semplici
10. E' una delle complicanze più frequenti nell'emiplegia:
- Sindrome dolorosa della spalla**
 - Sindrome dolorosa della caviglia
 - Sindrome dolorosa del ginocchio
 - Sindrome dolorosa dell'anca
11. Nell'andatura cosiddetta "steppage":
- Il paziente appoggia a terra il piede prima con l'avampiede e successivamente con il calcagno**
 - Il paziente extraruota e abduce a ginocchio esteso
 - Il paziente esegue una triplice flessione ogni volta che esegue il passo anteriore con l'arto lesa
 - Il piede è bloccato in flessione dorsale
12. Da quale radice inizia la cauda equina?
- L1**
 - L5
 - S1
 - S3
13. In stazione eretta, le oscillazioni del paziente affetto da squilibrio vestibolare:
- Peggiorano alla chiusura degli occhi
 - Migliorano alla chiusura degli occhi
 - Non presentano evidenti modificazioni alla chiusura degli occhi**
 - Peggiorano all'apertura degli occhi
14. Che cosa indica esattamente il termine bradicinesia?
- Assenza di movimento
 - Lentezza di movimento**
 - Manca di coordinazione
 - Incapacità di programmazione motoria
15. Quale fra le alternative proposte non rappresenta un territorio d'innervazione del nervo ascellare?
- Il muscolo deltoide
 - Il muscolo piccolo rotondo
 - Il muscolo grande rotondo**
 - L'articolazione scapolo-omerale
16. La sindrome di Guillain-Barré è una polineuropatia di origine:
- Infiammatoria autoimmune**
 - Dismetabolica
 - Ereditaria secondo le leggi di Mendel
 - Alcolica
17. Secondo quanto indicato nelle linee guida del Ministro della Sanità per le attività di Riabilitazione (30 maggio 1998, n.124), il progetto riabilitativo è:
- L'insieme dei programmi svolti da ciascun professionista a beneficio della persona malata

- b. Un patto sottoscritto con l'utente in cui vengono stabiliti gli obiettivi terapeutici e le principali strategie al riguardo
- c. L'insieme di proposizioni, elaborate dall'équipe riabilitativa, coordinata dal medico responsabile**
- d. La documentazione clinica di ogni persona affetta da patologie invalidanti, dalla raccolta dei dati anamnestici fino alla lettera di dimissione

18. I trattamenti sanitari sono:

- a. Sempre obbligatori
- b. Facoltativi per i maggiorenni ma obbligatori per i minorenni
- c. Obbligatori solo se disposti per legge**
- d. Sempre facoltativi

19. In quale tratto della colonna vertebrale le apofisi spinose hanno una maggior lunghezza ed inclinazione?

- a. Cervicale
- b. Toracico**
- c. Lombare
- d. Sacrale

20. Fra le seguenti, la frattura a maggior rischio per la sindrome di Volkmann è la frattura di:

- a. Polso
- b. Gomito**
- c. Femore
- d. Scafoide

21. Quale fra le seguenti caratteristiche anatomo-patologiche non si riscontra nell'artrosi?

- a. Sclerosi subcondrale
- b. Zone di osteolisi**
- c. Osteofitosi marginale
- d. Cavità geodiche

22. Quale fra le seguenti posizioni è da sconsigliare al paziente, operato con via d'accesso postero-laterale, perché favorisca la lussazione della protesi d'anca?

- a. Abduzione, flessione, intrarotazione
- b. Abduzione, flessione, extrarotazione
- c. Adduzione, flessione, intrarotazione**
- d. Adduzione, estensione, extrarotazione

23. Che cosa valuta l'indice di Risser?

- a. L'entità angolare della curva scoliotica
- b. Il grado di rotazione della vertebra
- c. Lo sviluppo del nucleo di accrescimento delle creste iliache**
- d. L'entità della gibbosità

24. La ventilazione alveolare al minuto in un soggetto sano è pari a circa:

- a. 2.250 ml/minuto
- b. 3.500 ml/minuto
- c. 5.250 ml/minuto**
- d. 7.500 ml/minuto

25. Tutte le seguenti affermazioni riguardo alla patologia bronchitica sono vere, tranne una. Quale?

- a. Il fumo è un fattore di rischio per la bronchite cronica

- b. La dispnea è il sintomo predominante nella bronchite cronica**
- c. La tosse è uno dei sintomi predominanti nella bronchite cronica
- d. Il paziente bronchitico cronico va incontro facilmente ad un aumento delle resistenze delle vie aeree

26. A quale età il bambino comincia a orientare il capo in direzione di un suono?

- a. Attorno al sesto mese
- b. Attorno al terzo mese**
- c. Attorno al primo mese
- d. Sin dalla nascita

27. Quale fra le seguenti affermazioni riguardo alla paralisi cerebrale infantile (PCI) è falsa?

- a. La paralisi cerebrale infantile può essere imputata a causa prenatali, perinatali e post-natali
- b. La paralisi cerebrale infantile provoca un danno permanente alla motricità
- c. L'encefalopatia ipossico-ischemica è una fra le principali cause di paralisi cerebrale infantile
- d. La paralisi cerebrale infantile ha connotazione degenerativo-progressiva**

28. Per scongiurare nella paziente mastectomizzata il pericolo di linfedema acuto infiammatorio, occorre:

- a. Non affaticare troppo il braccio
- b. Prevenire punture, graffi e tagli sul braccio del lato operato**
- c. Evitare di portare pesi eccessivi
- d. Lavare con particolare scrupolo ogni parte del corpo

29. Per l'amputato d'arto superiore la difficoltà dell'addestramento:

- a. È maggiore se l'amputazione è a livello del polso
- b. È maggiore se l'amputazione è a livello del terzo medio di avambraccio
- c. E' tanto maggiore quanto più l'amputazione è alta**
- d. Non dipende dal livello dell'amputazione

30. Quale fra le seguenti affermazioni è vera?

- a. L'impugnatura del ferro da stiro non è particolarmente nociva per i pazienti affetti da artrite reumatoide
- b. L'impugnatura del ferro da stiro se allargata può essere resa meno dannosa per i pazienti affetti da artrite reumatoide
- c. L'adattamento del ferro da stiro per i pazienti affetti da artrite reumatoide è costituito da un'impugnatura quasi perpendicolare a quella tradizionale**
- d. Ai pazienti affetti da artrite reumatoide è precluso l'utilizzo del ferro da stiro